

JAN HRUBÝ

VÝHRADNÍ DOVOZCE KRMIVA PRO KONĚ
ST. HIPPOLYT DO ČESKÉ REPUBLIKY

St Hippolyt[®]
NUTRITION CONCEPTS

Equi Lac Müsli



Krmivo pro chovné klisny optimalizované podle potřeb na základě dlouholetých zkušeností v plnokrevném chovu. Osvědčené krmivo pro chovné klisny pro příkrmování od 8. měsíce březosti.

**Vyvážený poměr bílkovin a energie
Bohaté na esenciální aminokyseliny
Vyvážený vzájemný poměr stopových prvků
Bohaté na mikrovýživné látky**

Papírový pytel - 25kg

Složení:

Ječmenné vločky, kukuřičné vločky, vojtěšková řezanka, melasa z cukrové řepy, jablečné výlisky, směs olejů ze semenek (lněné semeno, slunečnicové semeno, fenyklové semeno, semeno černuchy) 4,4 %, ječné klíčky, otruby z ovesných slupek, celozrnné ovesné vločky, byliny (máta peprná, anýz, fenykl) 2,5 %, travní řezanka sušená teplým vzduchem, pšeničné otruby, pivovarské kvasnice, kukuřičné klíčky, směs olejů (lněný, slunečnicový, z kukuřičných klíčků) 2,0 %, vápník z mořských řas, sůl, rýžové klíčky, hrachový protein, řízky z cukrové řepy, moučka z mořských řas, pšeničné klíčky, karoten, , L – lysin, DL – metionin, himálajská sůl.

Doporučené dávkování:

Jako doplňkové krmivo k obvyklému základnímu objemovému a energetickému krmivu doporučujeme od 8. měsíce březosti dosavadní množství energetického krmiva postupně nahradit produktem Equilac. Od 9. – 11. měsíce březosti krmit cca 400 – 500 g na každých 100 kg tělesné hmotnosti a den. Toto celkové množství je vhodné nabízet rozdělené na více denních dávek. U koní lehce, resp. obtížně krmitelných je možno tuto dávku přizpůsobit o cca 10 – 15 % denně směrem dolů, resp. nahoru. Oves může být případně podáván doplňkově. U speciálních plemen, pony a koní, kteří krmivo dobře využívají, lze doporučit podávání produktu Equilac jako jediného energetického krmiva. Od 1. – 3. měsíce laktace zvýšit postupně podávání Equilac až na 600 g na každých 100 kg hmotnosti koně, neboť kolem třetího měsíce laktace lze očekávat nejvyšší produkci mléka. Od 5. měsíce laktace podávání Equilac postupně opět zredukovat, vrátit se zpět k obvyklému energetickému krmivu a poté vysadit zcela.

Obsažené látky:		Výživné fyziologické přidavné látky na 1 kg:		Stopové prvky na 1kg:	
Surový protein	10,5%	Vitámín A	20.000I E	Železo	180mg
Surová vláknina	8,4%	Vitámín D3	2.200I E	Zinek	200mg
Surový tuk	5,5%	Vitámín E	350mg	Mangan	170mg
Surové popeloviny	9,0%	Vitámín B1	13mg	Měď	45mg
Stravitelný surový protein	92g/kg	Vitámín B2	13mg	Jód	1,8mg
Stravitelná energie	12,5MJ	Vitámín B6	8mg	Kobalt	3,0mg
		Vitámín B12	45mcg	Selen	0,6mg
Vápník	1,2%	Biotin	300mc g		
Fosfor	0,4%	Kyselina nikotinová	60mg		
Hořčík	0,4%	Kyselina listová	6mg		
sodík	0,5%	Kyselina pantotenová	26mg		
Lysin	0,5%	Chlorid cholinu	500mg		
Methionin	0,3%				